

Das Volumen eines Glases

Der Umriss eines Sektkelches gehorcht der Funktionsgleichung

$$f(x) = \frac{\sqrt{6}}{4} x^2.$$

Bei welcher Höhe h beträgt das Volumen des Kelches 0,2l?

Lösung

Angelehnt an das Prinzip des Cavalieri ergibt sich:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^h A(y) dy \\ &= \int_0^h \pi x^2 dy \\ (1) \text{ mit } y &= \frac{\sqrt{6}}{4} x^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{4}{\sqrt{6}} y \text{ folgt} \\ &= \int_0^h \pi \frac{4}{\sqrt{6}} y dy \\ &= \pi \frac{4}{\sqrt{6}} \int_0^h y dy \\ &= \pi \frac{4}{\sqrt{6}} \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^h \\ &= \pi \frac{4}{\sqrt{6}} \left[\frac{1}{2} h^2 - 0 \right] \\ &= \pi \frac{4}{\sqrt{6}} \frac{1}{2} h^2 = \pi \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot h^2 \end{aligned}$$

Also:

$$V(h) = \pi \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot h^2$$

Da $V=0,2l=200\text{ml}=200\text{cm}^3$ sein soll, ergibt sich:

$$200 = \pi \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot h^2 \Leftrightarrow h = \sqrt{\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 200} \approx 7,2\text{cm}$$

Zusammenfassung: Sei eine Funktion $f(x)$ $x \in [a,b]$ gegeben.

y-Achsen-Rotation

$$V(y) = \pi \int_{y_a=f(a)}^{y_b=f(b)} x^2 dy$$

x-Achsen-Rotation

$$V(x) = \pi \int_a^b y^2 dx$$

Beachte: $f(x)$ muss streng monoton sein, damit der Rotationskörper um die y -Achse berechnet werden kann (Umkehrfunktion bei (1)).

